

گیاهان بومی با ویژگی‌های زینتی برای کاشت در فضای سبز شهری تهران

سعیده سادات میرزاده واقفی*، عادل جلیلی، زیبا جم زاد

مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

✉ Mirzadeh@rifr-ac.ir

تاریخ دریافت: ۹۸/۹/۱۳، تاریخ پذیرش: ۹۹/۵/۲۵

چکیده

با توجه به مشکلات اقتصادی جهانی، نیاز به کاربرد گیاهان بومی زینتی در فضای سبز شهری روز به روز بیشتر احساس می‌شود. این گیاهان افزون بر سازگاری و پایداری، می‌توانند نقش مهمی در صرفه‌جویی ارزی ایفا نمایند و کشور را از ورود بسیاری از گیاهان زینتی بی‌نیاز کنند. هدف از این پژوهش معرفی گیاهان بومی سازگار شده برای فضای سبز شهر تهران بود. این پژوهش روی گیاهان سازگار شده در رویشگاه البرز جنوبی باغ گیاه شناسی ملی ایران انجام شد. گیاهان از رویشگاه اصلی به رویشگاه جدید انتقال و با گذشت سال‌ها با محیط سازگار شده و استقرار یافتند. گونه‌های معرفی شده از بین گونه‌های موفق در استقرار می‌باشند. بیست و سه گونه با توجه به داشتن ویژگی زینتی برای کاشت در سطح شهر تهران معرفی شدند.

واژه‌های کلیدی: باغ گیاه شناسی، رویشگاه البرز، گیاهان کاشته شده، استقرار، ویژگی‌های زینتی.

مقدمه

به کود، آفت کش و آبیاری قدرت زنده مانی در محیط را خواهند داشت (Christopher, 2011). وجود گیاهان غیربومی منجر به گسترش گیاهان مهاجم در محیط شهری شده به طوری که گیاهان بومی منطقه را مورد تهدید قرار می‌دهند. کاربرد گیاهان بومی در فضای سبز شهری به عنوان یک گزینه مدیریت و طراحی فضای سبز باید مد نظر قرار گیرد (Uanjuan, 2010). کاشت گونه‌های بومی منجر به بهبود زیگان از جمله زنبورها و پرندگان آن منطقه می‌شود (Aronson et al., 2017).

احداث فضای سبز با استفاده از گونه‌های زیبا و سازگار با شرایط اکولوژیک منطقه اهمیت ویژه‌ای دارد. از این رو، شناسایی گونه‌های بومی در اولویت قرار می‌گیرد. در این

فضای سبز شهری محیطی است که برای زیباسازی و تامین تازگی و شادابی محیط شهری ضروری است. وضعیت اقلیمی و شرایط ناپایدار منابع مختلف از جمله آب، مدیران شهری را ناچار به کاربرد گونه‌های بومی در طراحی منظر و فضای سبز خواهد کرد (Karimian, 2016). با توجه به گسترش سریع شهرها وجود فضای سبز شهری برای سلامت ساکنین بسیار ضروری می‌باشد. کاربرد گیاهان بومی هر منطقه سودمندی‌هایی دارد. این گیاهان به علت سازگاری چند هزار ساله گیاه با اقلیم، جغرافیا و آب منطقه، و بدون نیاز

راستا تعیین گونه‌های گیاهی دارای تحمل به خشکی و شوری خاک در مناطق گرم و خشک برای طراحی فضای سبز از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد (Heidari Asl & Maeerofi, 2016) این نمونه گیاهان، نیاز به حاصلخیزی و غنی ساختن خاک نداشته و نسبت به گیاهان غیربومی به سموم کمتری برای از بین بردن آفات نیاز دارند. به دلیل شرایط ویژه ای که مناطق خشک دارند از جمله بارندگی و رطوبت کم، تبخیر بالا و وزش بادهای شدید کاربرد گونه‌های بومی که به شرایط این مناطق سازگار هستند و طی سالیان طولانی در آنجا رشد و نمو داشته‌اند می‌تواند سودمند باشد (Mousavi et al., 2013). در این راستا تلاش‌های پراکنده‌ای در مناطق مختلف ایران انجام شده است. اما تمام آنها در سطح کوچک و آزمایشی مانده است. در پژوهشی که روی شیوه‌گزینش گیاهان برای فضای سبز شهری صورت گرفت، به نبود کارشناسی در گزینش گیاهان در فضای سبز شهری به عنوان یکی از نقطه ضعف‌های طراحی فضای سبز اشاره شد. یکی از دشواری‌های بزرگ این طراحی‌ها ناسازگاری گونه‌های گزینش شده با شرایط اکولوژیک است که با گزینش گونه‌های بومی منطقه به طور کامل برطرف می‌شود (Taghizadeh & Minaeei, 2012). در یک بررسی گونه‌های سنجدا^۱، توت^۲، بادام کوهی^۳ و بنه^۴ به عنوان گونه‌های بومی و سازگار با آب و هوای درگاهان تفت یزد معرفی شدند (Joozi et al., 2017). در پژوهشی که روی گل ماهور^۵ و شیرپنیر^۶ انجام شد، این گیاهان به

عنوان گیاهان دارای تحمل و بومی برای کاشت در فضای سبز شهر تهران پیشنهاد شدند (Mirzadeh Veghefi, 2014). در بررسی دیگری که روی گیاهان درختی شهر شیراز صورت گرفت، ۸ گونه درخت بومی برای کاشت در فضای سبز شهری پیشنهاد شد. ارس^۷، انجیر وحشی^۸، نارون^۹، بنه، بلوت^{۱۰} و داغداغان^{۱۱} از نمونه درختان پیشنهاد شده بودند (Mesbah & Soleimanpour, 2016). در پژوهشی بررسی گونه‌های *Allium* بومی ایران با ویژگی زینتی برای کاشت در خرم آباد صورت گرفته است (Fathi Manesh et al., 2017). گونه‌هایی از این گیاه برای کاشت در فضای سبز شهری پیشنهاد شدند.

در شمال تهران، آب و هوا معتدل و کوهستانی و در نقاط کم‌ارتفاع نیمه‌خشک است. باغ گیاه‌شناسی ملی ایران به گستره ۱۴۵ هکتار در دامنه جنوبی رشته‌کوه البرز مرکزی در ناحیه چیتگر، در غرب تهران (در محدوده شهرداری منطقه ۲۲) قرار دارد. عرض جغرافیایی این مکان ۳۵ درجه و ۴۱ دقیقه شمالی و طول جغرافیایی آن ۵۱ درجه و ۱۹ دقیقه شرقی در ارتفاع ۱۳۲۰ متری از سطح دریا با شیب اصلی ۲/۶٪ (شمال به جنوب) و شیب فرعی ۱/۹٪ (غرب به شرق) است. باغ گیاه‌شناسی ملی ایران به عنوان بستری مناسب برای بررسی چگونگی استقرار گیاهان بومی مناطق مختلف ایران می‌باشد. هدف باغ گیاه‌شناسی آشنا کردن مردم با طبیعت و زیستگاه‌های طبیعی ایران و جهان، و اهمیت نگهداری از آن هاست. به طور پیوسته گونه‌های بومی و غیر بومی به باغ افزوده می‌شوند و گوناگونی گونه‌ای باغ همواره در حال افزایش است. پس

1. *Eleaegnus angustifolia* L.
2. *Morus alba* L.
3. *Amygdalus scoparia* Spach
4. *Pistacia atlantica* Desf.
5. *Verbascum nigrum* L.
6. *Galium verum* L.

7. *Juniperus excels* M.Bieb.
8. *Ficus carica* L.
9. *Ulmus* spp.
10. *Quercus* spp.
11. *Celtis australis* L.



یافته‌اند. افزون بر آن ویژگی زینتی گیاهان مانند زیبایی رنگ گل، میوه، برگ‌ها، دوره گلدهی طولانی، نیاز نداشتن به آب فراوان و موفقیت در استقرار و سازگاری بالا با محیط برای معرفی آن‌ها در نظر گرفته شد.


باغ گیاه شناسی با بیش از ۲۵ مجموعه گیاهی و گوناگونی بیش از ۴۰۰۰ گونه گیاهی شامل رویشگاه‌های اقلیم‌های حیاتی داخل کشور و تعدادی از رویشگاه‌های برجسته در سایر اقلیم‌های حیاتی دنیا، مجموعه‌های گوناگونی از باغ‌های موضوعی در خود جای داده است. در این پژوهش که نتیجه بیست سال کوشش پیوسته در بخش البرز می‌باشد، گونه‌هایی که ویژگی زینتی دارند و استقرار موفقی در رویشگاه داشتند برای استفاده در فضای سبز شهری پیشنهاد شده‌اند.

از استقرار گیاهان، ریخت شناسی و چگونگی رفتار آن‌ها در رویشگاه جدید بررسی می‌شود. در نتیجه گونه‌هایی که به باغ انتقال یافته‌اند همیشه زیر نظر می‌باشند. از مهم‌ترین مجموعه‌های باغ می‌توان به بخش‌های ایران-تورانی، البرز، هیرکانی، زاگرس، باغ میوه، باغ سیستماتیک و نمایشی اشاره کرد (شکل ۱). با توجه به این که رویشگاه البرز جنوبی شامل منطقه تهران و اطراف آن می‌باشد، از این رو گونه‌هایی که در رویشگاه باغ گیاه شناسی سازگار شده‌اند و دارای ویژگی زینتی می‌باشند می‌توانند گزینه‌های خوبی برای کاشت در فضای سبز شهر تهران بدون آزمون و خطا باشند (شکل ۲). گونه‌های معرفی شده در این پژوهش از بین صدها گونه‌ای می‌باشند که با آزمون و خطا وارد رویشگاه شده و استقرار



شکل ۱- نقشه باغ گیاه‌شناسی ملی ایران و جایگاه رویشگاه البرز (شماره ۱۴، بنفش رنگ).

Figure 1- Map of National Botanical Garden of Iran and the location of Alborz habitat (No. 14, purple).



شکل ۲- رویشگاه البرز جنوبی و آبشار آن.

Figure 2- South Alborz habitat and its waterfall.

مواد و روش‌ها

گیاهان از رویشگاه اصلی خود گزینش و به روش‌های قلمه، بذر و انتقال گیاه کامل توسط گلدان، به باغ گیاه شناسی ملی ایران منتقل و در مکان‌های مناسب کشت شدند. مدت زمان گلدهی و سایر ظرفیت‌های زینتی یادداشت برداری شد.

نتایج و بحث

گونه‌های معرفی شده در جدول ۱ پس از بررسی چند سال پی در پی در رویشگاه البرز باغ گیاه شناسی ملی ایران پیشنهاد شدند. گونه‌های معرفی شده گونه‌هایی می‌باشند که استقرار موفقی در رویشگاه داشته‌اند. همچنین بیشتر این گونه‌ها دارای تحمل به کم آبی می‌باشند. گستره رنگ گل‌های گونه‌ها سفید، صورتی، نارنجی، بنفش و زرد می‌باشد. رنگ‌های نامبرده در طبیعت نیز بسیار دیده می‌شود (جدول ۱).

گونه *Heteropappus altaicus* با گل‌های آبی مایل به بنفش و دوره گل‌دهی طولانی و نیاز آبی کم گونه‌ای بسیار مناسب برای کاشت در فضای سبز شهر تهران می‌باشد. رنگ گل‌های این گونه طبیعی و جلوه‌ای ویژه و متفاوت دارد (شکل ۳ ب و ج). *Glaucium elegans* نیز با گل‌های زرد تا نارنجی رنگی ویژه و زیبا را به نمایش می‌گذارد (شکل ۴ گ).

گونه‌های *Daturea stramonium* *Heteropappus* *Senecio vernalis altaicus* به طور خودرو در این منطقه رویش دارند. گونه‌ها نامبرده سازگار شده و در قسمت‌هایی از قطعه با بذر یا نشا کاشته شده‌اند. جدول ۲ زمان گل‌دهی گونه‌های مختلف مورد بررسی را بر اساس ماه نشان می‌دهد.

جدول ۱- نام علمی گیاهان، تیره، نام فارسی، رنگ گل، جنبه‌های زینتی، نیاز آبی، نوع گیاه و روش افزایش آن.

Table 1- Scientific name of plants, family, Persian name, flower color, ornamental aspects, water requirement, type of plant and method of reproduction it.

روش افزایش	نوع گیاه	نیاز آبی	اندام زینتی	رنگ گل	نام فارسی	تیره	نام علمی
Propagation method	Plant type	Water requirement	Ornamental parts	Flower color	Persian name	Family	Scientific name
پاجوش	درختچه	متوسط	میوه و برگ	سبز	سماق	Anacardiaceae	<i>Rhus coriaria</i> L.
بذر	علفی چندساله	کم	گل	یاسی		Asteraceae	<i>Heteropappus altaicus</i> (Willd.) Novopokr
بذر	علفی چندساله	کم	گل	سفید	بومادران	Asteraceae	<i>Achillea millefolium</i> L.
بذر	علفی چندساله	کم	گل	زرد	بابونه	Asteraceae	<i>Tanacetum parthenium</i> (L.)Schultz-Bip.
بذر	علفی چندساله	متوسط	گل	زرد		Asteraceae	<i>Triplospermum disciforme</i> (C.A.Mey.) Schultz-Bip

<i>Achillea vermicularis</i> Trin.	Asteraceae	بومادران	زرد	گل	کم	علفی چندساله	بذر
<i>Senecio vernalis</i> Waldst. & Kit.	Asteraceae		زرد	گل	کم	علفی یک ساله	بذر
<i>Lonicera nummulariifolia</i> a Jaub. & Spach.	Caprifoliaceae	پلاخور	سفید	گل و میوه	کم	درختچه	بذر و قلمه
<i>Lonicera iberica</i> M. B.	Caprifoliaceae	پلاخور	سفید	گل و میوه	کم	درختچه	بذر و قلمه
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Gracke	Caryophyllaceae	سیلین	سفید	گل	متوسط	علفی چندساله	بذر
<i>Ballota nigra</i> L.	Lamiaceae		بنفش	گل	کم	علفی چندساله	بذر
<i>Salvia nemorosa</i> L.	Lamiaceae	مریم گلی	بنفش	گل	کم	علفی چندساله	بذر
<i>Stachys inflata</i> Benth.	Lamiaceae		بنفش	گل و برگ (نقره‌ای)	کم	علفی چندساله	بذر
<i>Glaucium elegans</i> Fisch. & C. A. Mey.	Papaveraceae		زرد تا نارنجی	گل	کم	علفی چندساله	بذر
<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	Rosaceae	توت روباهی	سبز	میوه	کم	علفی چندساله	بذر
<i>Rosa foetida</i> Herrm.	Rosaceae	نسترن زرد	زرد	گل	متوسط	درختچه	قلمه
<i>Rosa canina</i> L.	Rosaceae	نسترن	سفید یا صورتی	گل	متوسط	درختچه	قلمه
<i>Amygdalus scoparia</i> Spach	Rosaceae	بادام کوهی	سفید	گل و ساقه	کم	درختچه	بذر
<i>Amygdalus lycioides</i> Spach	Rosaceae	تنگرس	صورتی	گل	کم	درختچه	بذر
<i>Crataegus astrosanguinea</i> A. Pojark.	Rosaceae	زالزالک قرمز	سفید	میوه	کم	درخت	بذر
<i>Verbascum songaricum</i> Schrenk ex Fisch. & C.A. Mey.	Scrophulariaceae	گل ماهور	زرد	گل	کم	علفی چندساله	بذر
<i>Datura stramonium</i> L.	Solanaceae	تاتوره	سفید	گل	کم	علفی یکساله	بذر
<i>Ziziphus jujube</i> Mill.	Rhamnaceae	عناب	سبز	میوه	کم	درخت	بذر و پاجوش

جدول ۲- زمان گلدهی گونه‌ها بر اساس ماه‌های سال.

Table 2- Flowering time of species based on months of the year.

نام علمی Scientific name	فروردین Mar. – Apr.	اردیبهشت Apr.- May.	خرداد May- Jun.	تیر Jun. -Jul.	مرداد Jul.- Aug.	شهریور Aug. – Sep.	مهر Sep. - Oct.	آبان Oct. – Nov.	آذر Nov. –Dec.	دی Dec. –Jan.	بهمن Jan.- Feb.	اسفند Feb. – Mar.
<i>Rhus coriaria</i>		*										
<i>Heteropappus altaicus</i>				*	*	*	*	*				
<i>Achillea millefolium</i>		*	*	*								
<i>Tanacetum parthenium</i>			*	*	*							
<i>Triplospermum disciforme</i>		*	*									
<i>Achillea vermicularis</i>		*	*	*								
<i>Senecio vernalis</i>	*											*
<i>Lonicera nummularifolia</i>	*	*										
<i>Lonicera iberica</i>	*	*										
<i>Silene vulgaris</i>	*		*	*								
<i>Ballota nigra</i>	*		*	*	*	*						
<i>Salvia nemorosa</i>	*		*	*								
<i>Stachys inflata</i>	*		*									
<i>Glaucium elegans</i>	*											
<i>Sanguisorba minor</i>	*		*									
<i>Rosa foetida</i>	*											
<i>Rosa canina</i>	*											
<i>Amygdalus scoparia</i>	*	*										
<i>Amygdalus lycioides</i>	*	*										
<i>Crataegus astrosanguinea</i>	*											
<i>Verbascum songaricum</i>			*	*	*	*	*					
<i>Datura stramonium</i>				*	*	*						
<i>Ziziphus jujuba</i>	*	*										

گونه *Senecio vernalis* در اسفند ماه تا نیمه فروردین ماه در زمانی که سایر گیاهان خفته هستند گل داده و جلوه ویژه ای به محیط می دهد (شکل ۳ الف). از این رو داشتن آن در فضای سبز در این فصل بدون نیاز به آبیاری ممکن است. همچنین گونه *Heteropappus altaicus* که از تیرماه تا نیمه آبان ماه دارای گل می باشد، تمام تابستان و اوایل پاییز با رنگی متفاوت و زیبا (یاسی) در محیط خودنمایی می کند (شکل ۳ ب و ج). گونه *Datura stramonium* با گل های شیپوری بزرگ سفید در فصل تابستان گل می دهد (شکل ۵ ک).

بر اساس پژوهش های پیشین، گل ماهور که به عنوان گونه ای با توان بالا برای کاربرد در فضای سبز شهری معرفی شده است (میرزاده واقفی، ۱۳۹۳)، دارای رنگ زرد با بازتاب نور بسیار در محیط و دوره گلدهی طولانی است. گونه های تیره *Rosaceae* با توجه به داشتن شکوفه های زیبا در فصل بهار و میوه های رنگارنگ در فصل پاییز، زیبایی چشمگیری به فضای سبز شهری می دهند (شکل ۳ گ؛ شکل ۴ الف، ب و ک؛ شکل ۵ ذ و د). گونه *Sanguisorba minor* با داشتن میوه سبز، برگ های منشعب و افزایش آسان با وجود نداشتن تفاوت ویژه، جلوه زیبایی دارد (شکل ۵ ب). تیره *Asteraceae* دارای گونه های دارای تحمل به کم آبی با دوره گلدهی مناسب برای کاشت در فضای سبز می باشد (شکل ۳، الف تا ذ؛ شکل ۴ ل و شکل ۵ ج). گیاهان تیره *Lamiaceae* افزون بر زیبایی به علت دارا بودن ماده های موثره دارای عطر ویژه نیز می باشند که پس از باران و آبیاری فضای اطراف خود را معطر می نمایند (شکل ۴ د؛ شکل ۵ الف). نوع بهنژادی شده سیلن در رنگ های گوناگون به عنوان زینتی در شهر تهران نیز کاشته می شود. گیاه *Silene vulgaris* از جمله گیاهان بومی با گل های سفید است که

می توان در فضای سبز شهری نیز از آن استفاده نمود (شکل ۴ ذ). فرم چتری و کوتاه درختچه سماق با برگ هایی زیبا و دارای تحمل به کم آبی، مناسب برای کاشت در بیشتر مناطق تهران است (شکل ۳ ک).

در بین گونه های معرفی شده تعدادی دارای میوه های زیباتری نسبت به گل هایشان هستند. از جمله این گیاهان می توان از درخت و درختچه های *Lonicera*، *Crataegus astrosanguinea*، *Rhus* و *Lonicera iberica nummulariifolia* نام برد (شکل ۳ ک، گ و ل، شکل ۴ الف). در مورد درختان افزون بر گل، میوه آنها نیز دارای جنبه زینتی می باشد. *Amygdalus scoparia* دارای ساقه هایی سبز رنگ و زیبا بوده که از سطح زمین، شاخه های گیاه انشعاب دارند و زیبایی متفاوتی را به نمایش می گذارد (شکل ۴ ک).

همان طور که در جدول ۲ دیده می شود به جز آذر، دی و بهمن ماه، در تمام ماه های سال توالی گل دهی بین گونه ها دیده می شود. در نتیجه شاهد فصل هایی با تناوب گلدهی در رویشگاه می باشیم. اوج گل دهی همان گونه که در سایر نقاط هم دیده می شود در اردیبهشت ماه است. در حال حاضر بیشتر گونه های نامبرده به ویژه گیاهان یکساله و چند ساله توان باززایی خود در رویشگاه البرز را دارند. از آن جا که شهر تهران در منطقه البرز جنوبی واقع شده است، از این رو گیاهان خودروی منطقه به طور کامل به این بخش از باغ گیاه شناسی تعلق دارند. با نگاهی به آن ها می توان پی برد که چه توانایی برای زینت بخشیدن به بخش در فصل های رویش وجود دارد. برگ های درخت زالزالک در فصل پاییز گوناگونی رنگی بسیار بالایی از زرد تا نارنجی دارد. از این نظر نیز می توان روی زیباسازی آن در پاییز تاکید کرد (شکل ۳، گ).

رویشگاه موجود است. گزینش، بر اساس توان استقرار، ویژگی زینتی و نیاز آبی متوسط تا کم بوده است.

هرچند گونه‌های مورد بررسی تمام گونه‌های موجود در رویشگاه البرز نیستند و گوناگونی بالاتری در این



الف (A)



ب (B)



ج (C)



د (D)



ذ (Z)



ک (K)



گ (G)



ل (L)

شکل ۳- الف: *Senecio vernalis* ب و ج: *Heteropappus altaicus* د: *Tanacetum parthenium*

ذ: *Triplospermum disciforme* ک: *Rhus coriaria* گ: *Crataegus astrosanguinea* ل: *Lonicera nummulariifolia*

Figure 3- A: *Senecio vernalis*, B & C: *Heteropappus altaicus*, D: *Tanacetum parthenium*, Z: *Triplospermum disciforme*, K: *Rhus coriaria*, G: *Crataegus astrosanguinea*, L: *Lonicera nummulariifolia*.



الف (A)



ب (B)



ج (C)



د (D)



ذ (Z)



ک (K)



گ (G)



ل (L)

شکل ۴- الف: *Crataegus astrosanguinea*، ب: *Rosa foetida*، ج: *Verbascum songaricum*، د: *Stachys inflata*،

ذ: *Silene vulgaris*، ک: *Amygdalus scoparia*، گ: *Glaucium elegans*، ل: *Achillea millefolium*.

Figure 4- A: *Crataegus astrosanguinea*, B: *Rosa foetida*, C: *Verbascum songaricum*, D: *Stachys inflata*, Z: *Silene vulgaris*, K: *Amygdalus scoparia*, G: *Glaucium elegans*, L: *Achillea millefolium*.



الف (A)



ب (B)



ج (C)



د (D)




ذ (Z)



ک (K)

شکل ۵- الف: *Ballota nigra*؛ ب: *Sanguisorba minor*؛ ج: *Achillea vermicularis*؛ د: *Amygdalus lycioides*؛ ذ: *Rosa canina*؛ ک: *Datura stramonium*.

Figure 5- A: *Ballota nigra*, B: *Sanguisorba minor*, C: *Achillea vermicularis*, D: *Amygdalus lycioides*, Z: *Rosa canina*, K: *Datura stramonium*.



شکل ۶- شمار گونه‌های تیره‌های معرفی شده.

Figure 6- The number of species in introduced families.

اختصاص می‌دهند (Mirzadeh Vaghef *et al.*, 2008). بنابراین در این مورد نیز نتیجه غیر قابل پیش‌بینی نمی‌باشد.

همان‌طور که در شکل ۶ دیده می‌شود بیشتر گونه‌ها متعلق به تیره‌های Rosaceae و Asteraceae و سپس Lamiaceae می‌باشند. در بین گیاهان زینتی و در طبیعت، این سه تیره شمار زیادی از گونه‌ها را به خود

منابع

- Aronson, M.F.J., Lepczyk Ch.A., Evans K.L., Goddard M.A., Lerman S.B., Scott, J., MacIvor, Ch., Nilon, H., Vargo, T. (2017). Biodiversity in the city: key challenges for urban green space management. *Front Ecology Environment*, 15(4), 189-196.
- Christopher, T. (2011). *New American Landscape: Leading Voice on the Future of Sustainable Gardening*. Timber press.
- Fathi Manesh, Z., Rezaei Nejad, A., Mousavi Fard, S., Viskarami, Gh. (2017). Evaluation of ornamental ability of some species of *Allium* genus in Khorramabad climate. *Crops Improvement*, 19(3), 678-700 (In Persian).
- Heidari Asl., E., Maerofi, E.R. (2016). Green space and its standards with a strategic view of hot and dry regions of Iran. *Journal of NAJA Deputy of Engineering*, 99-129 (In Persian).
- Joozi, F., Iran Nejad Parizi, M., Tazeh, M.H., Mirshamsi, A., Mousavi, S. (2017). Green road design and landscaping using native plants in arid areas (Case study: Dargahan, Yazd: Taft). *Environmental Science and Engineering*. 3 (11), 61-51 (In Persian).
- Karimian, Z. (2016). Native plants in the urban landscape. *Journal of Flower and Ornamental Plants*, 4(1), 78-86 (In Persian).
- Mayrand F., Clergeau, Ph. (2018). Green roofs and green walls for biodiversity conservation: a contribution to urban connectivity? *Sustainability*, 10(985), 1-13.
- Mesbah, S.H., Soleimanpour, S.M. (2016). Native plant species, the solution for sustainable development of green space in Shiraz in water scarcity. The first conference on Shiraz ecological resilience, Shiraz (In Persian).
- Mirzadeh Vaghefi, S.S., Rajamand, M.A., Khayami, M. (2008). Introducing cultivated plants in Tehran city. *Journal of Biology*, 21(2), 298-314 (In Persian).
- Mirzadeh Vaghefi, S.S. (2014). *Verbascum* spp. and *Galium humifusum*, native plants that can be used in green space. The First National Congress of Flower and Ornamental Plants of Iran (In Persian).

- Mousavi, S., Iran Nejad Parizi, M. (2013). The importance of landscaping with native species in arid and semi-arid regions. The First National Conference on Geography, Urban Planning and Sustainable Development. Koomesh Environment Association (In Persian).
- Taghizadeh, K., Minaei, E. (2012). How to select plants in the planning and architecture of urban green spaces in Iran. *Human Geography Research*, 81, 127-140 (In Persian).
- Uanjuan Z.Z., Ouyang, Hua Z., Weiqi, Z., Xiaoke, W., Weihua, X., Yongming, N. (2010). Plant species composition in green spaces within the built-up areas of Beijing, China. *Plant Ecology*, 209, 189-204.

Native plants with ornamental potential for planting in urban green space of Tehran

Saeedeh Sadat Mirzadeh Vaghefi*, Adel Jalili, Ziba Jamzad

Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization
(AREEO), P.O. Box 13185-116, Tehran, Iran
✉ Mirzadeh@rifr-ac.ir

Abstract

The need to use native plants in urban green spaces has increasingly felt. Due to the global economic problems, native plants, in addition to compliance and stability, can play an important role in currency saving and probably to save the needless expenditure of the more import ornamental plants. The purpose of this study was to introduce native domesticated plants for green space of Tehran. This study was carried out on domesticated plants in the southern Alborz habitat of the National Botanical Garden of Iran. The plants were transferred from the field to the habitat, adapted and settled over the years. The introduced species are among the most successful species in establishment. Twenty-three species were introduced based on their ornamental potential for planting in Tehran.

Keywords: National Botanical Garden, Alborz habitat, Cultivated plants, Establishment, Ornamental potential.